

ALERTAS DE SEGURIDAD

CIRUGIA EN CONSULTORIOS.
El nuevo enemigo de la Cirugía Plástica.

Décimo Comunicado

Se considera que hoy en **USA** más del **50%** de la cirugía plástica se realiza en **el consultorio** del Cirujano Plástico.



50%

El gran problema radica en que la elección del consultorio para realizar cirugías esta sucediendo única y exclusivamente por **costos**.



La principal causa de muerte en consultorios después del **TEP** son los paros cardiacos derivados de un mal manejo de la vía aérea, **por personal no entrenado y con monitoreo insuficiente**.



La mortalidad en **USA** en consultorios es **10 veces mayor** que las mismos procedimientos realizados en centros de Cirugía Ambulatoria.



En nuestro medio, la cirugía plástica realizada en consultorios puede ser **sinónimo** de **cirugía realizada por: un falso Cirujano Plástico, inseguridad, infección y muerte**.



En **Alemania** en un estudio publicado por Lehnhardt en PRS 2008, encontró que de **72 complicaciones severas que incluían 23 muertes, el 76% de estos pacientes se hicieron en consultorios**. En estos pacientes la **infección** fue el causante del **80%** de las muertes y el **77% fueron realizados por especialistas diferentes al cirujano plástico**.

Es importante mantener los altos estándares de Seguridad en Cirugía Plástica y por eso nuestra cirugía solo debe ser realizada por un **Cirujano Plástico Certificado**, en una institución reconocida que cumpla con todos los estándares de seguridad y al lado de un **Anestesiólogo con experiencia**.



Los pacientes que cumplan los criterios a continuación expuestos, no se consideran ambulatorios y se deben quedar hospitalizados de 18 a 24 horas.

La mayoría de las cirugías plásticas se pueden hacer de forma ambulatoria, lo importante es seguir los criterios de que cirugía son ambulatorias y que cirugías no.

ESTO ES SINÓNIMO DE SEGURIDAD.

Protocolo

Definición de cirugía plástica que no debe ser ambulatoria


1. Paciente **> 65 años**



2. Cualquier cirugía con duración **>3 horas**.



3. Cualquier cirugía con liposucción, cuando supera un litro de grasa extraída.



4. Pacientes cuyos líquidos totales administrados superan los cuatro litros.



5. Liposucciones por encima de cuatro litros de grasa total extraída



6. Pacientes con



7. Mamas de reducción



8. Ritidoplastia



9. Abdominoplastia



10. Pacientes con sangrado intraoperatorio



11. Temperatura intraoperatoria



12. Pacientes con:



13. Pacientes con mareo que no le permite una adecuada deambulacion antes de su salida a casa.



14. Pacientes con:



ASA American Society of Anesthesiology (Clasificación estado del paciente)

15. Pacientes con cifras de glicemia altas en el intraoperatorio.



16. Pacientes que presentaron hipertensión arterial en el intraoperatorio.



17. Pacientes diabéticos, así estén bien controlados.



¿Tienes algún paciente con complicaciones?, ¿Necesitas ayuda?, ¿Orientación técnica?, ¿Presencia de un experto que te ayude? ¡No dudes, comunícate con nosotros!