

ALERTAS DE SEGURIDAD



Muerte en Lipoaspiración

Segundo Comunicado

Recomendaciones Preventivas

Encuesta realizada en 2014

Existe un **aumento mundial** en el número de procedimientos de **Liposucción**; en algunos países, ha aumentado **hasta el 200%**.

En México en el año 2013, **se realizaron 62,713 lipoaspiraciones**.

•Gracer FM, Jong RH. Fatal outcomes from liposuction. Census survey of cosmetic surgeons. Reconstr Surg 2000;105:436-446.
•www.isaps.org/news/isaps.global.statistics.

Aumento del 200% de liposucciones a nivel mundial




*Reporte de ASAPS

Las causas de mortalidad son:

•Tromboembolia	23%
•Perforaciones	15%
•Embolismo graso	8.5%
•Fallas cardíacas	5%
•Infección	5%
•Hemorragia	5%
•Desconocida	9%

Las causas de mortalidad en México son:



Los reportes del ASAPS no contemplan:

La incidencia de muerte súbita (primeras 24 hrs.), mortalidad asociada a infiltración grasa en glúteos, mortalidad asociada a la lidocaína.

Manifestaciones clínicas previas al deceso:



- **68.73%** Disnea, tos, hipotensión, bradicardia y desaturación.
- **26.46%** Apnea, arritmia, taquicardia, convulsiones, cefalea, dolor precordial y vasodilatación.
- **7.81%** Otras manifestaciones.

La aplicación de las **metas internacionales de seguridad** y las **recomendaciones específicas de la especialidad**; disminuirán la incidencia de complicaciones fatales en los **procedimientos de lipoaspiración**.

Muertes súbitas relacionadas a lipoaspiración

43 casos (67.10%)
Número de muertes que pudieron prevenirse.

5 casos
Perforaciones de vísceras o vasos sanguíneos

12 casos
Antes de iniciar la cirugía

18 casos
Fallecieron sin estar hospitalizados

1 caso
Falleció en el consultorio

7 casos
Enfermedad previa